Funzioni integrali

Esercizi #3

(Funzioni integrali) Calcolo integrale

Manolo Venturin

~~~ 23 ~~~

Donazione

Se apprezzi le mie slide, considera di fare una donazione per supportare il mio lavoro.

Grazie!

Indice degli esercizi

Studiare le seguenti funzioni integrali:

$$1. F(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

- dire inoltre, al variare di α , quante soluzioni ha l'equazione $F(x) = \alpha x$

$$2. F(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2 t}{2}}} dt$$

$$3. F(x) = \int_0^x \arctan(2 + \cos t) dt$$

Se vi piace iscrivetevi al canale, mettete un mi piace o lasciate un commento

Soluzione

Esercizio 1

Studiare la seguente funzione integrale (error function)

$$F(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

Dire inoltre, al variare di α , quante soluzioni ha l'equazione $F(x) = \alpha x$

Soluzione

Di questa funzione eseguiremo lo studio:

1. del dominio
2. del comportamento all'infinito
3. della derivata prima
4. della derivata seconda
5. ed eseguiremo una bozza del grafico

Esercizio 1

Soluzione

La funzione integranda $f(t) = e^{-t^2}$ è continua e integrabile in senso improprio su tutto $\mathbb{R}$

La derivata prima di

$$F(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

è

$$F'(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$$

Si ha che

$$F'(x) > 0 \quad \forall x$$

Essendo strettamente crescente non ci sono mai massimi o minimi

Esercizio 1

Essendo $F(0) = 0$ e $F'(x) > 0$ segue che

- $F(x)$ è positiva per $x > 0$
- $F(x)$ è negativa per $x < 0$

Proviamo che $F(x)$ è dispari, infatti

$$\begin{aligned} F(-x) &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{-x} e^{-t^2} dt \\ &= (u = -t, du = -dt) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-u^2} \cdot (-1) du \\ &= -\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-u^2} du = -F(x) \end{aligned}$$

Esercizio 1

Essendo dispari ci basta studiare solo il comportamento per $x > 0$

Si ha (essendo integrabile in senso improprio)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt = \ell > 0 \quad (\text{finito})$$

Si potrebbe dimostrare che, dall'integrale $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$, si ha

$$\ell = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = 1$$

Esercizio 1

La derivata seconda di

$$F(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt \quad , \quad F'(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot e^{-x^2}$$

è

$$F''(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot e^{-x^2} \cdot (-2x)$$

Si ha

- $F''(x) = 0$ per $x = 0$
- $F''(x) < 0$ per $x > 0$
- $x = 0$ è un punto di flesso

Esercizio 1

Esercizio 1

Dal momento che la $F'(x) > 0$ e $F'(0) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}$, allora $F(x) = \alpha x$ si ha che

- se $\alpha \leq 0$: 1 intersezione
- se $0 < \alpha < \frac{2}{\sqrt{\pi}}$: 3 intersezioni
- se $\alpha = \frac{2}{\sqrt{\pi}}$: 1 intersezione
- se $\alpha > \frac{2}{\sqrt{\pi}}$: 1 intersezione

Esercizio 2

Studiare la seguente funzione integrale (integrale ellittico)

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2 t}{2}}} dt$$

Di questa funzione eseguiremo lo studio:

1. del dominio
2. del comportamento all'infinito
3. della derivata prima
4. della derivata seconda
5. ed eseguiremo una bozza del grafico

Esercizio 2

Soluzione

Dal fatto che

$$-1 \leq \sin t \leq 1 \iff 0 \leq \sin^2 t \leq 1 \iff 0 \leq \frac{\sin^2 t}{2} \leq \frac{1}{2}$$

si ha

- la funzione integranda non ha problemi di dominio
- è sempre positiva

e inoltre

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2 t}{2}}} \in [1, \sqrt{2}]$$

Esercizio 2

La derivata prima di

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2 t}{2}}} dt$$

è

$$F'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2 x}{2}}}$$

Si ha (dalle premessa precedente) che

$$F'(x) > 0 \quad \forall x$$

Essendo strettamente crescente non ci sono mai massimi o minimi

Esercizio 2

Essendo $F(0) = 0$ e $F'(x) > 0$ segue che

- $F(x)$ è positiva per $x > 0$
- $F(x)$ è negativa per $x < 0$

Proviamo che $F(x)$ è dispari, infatti

$$\begin{aligned} F(-x) &= \int_0^{-x} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2 t}{2}}} dt \\ &= (u = -t, du = -dt) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2(-u)}{2}}} \cdot (-1) du \\ &= - \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2 u}{2}}} du = -F(x) \end{aligned}$$

Esercizio 2

Essendo dispari ci basta studiare solo il comportamento per $x > 0$

Dal momento che

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2 t}{2}}} \in [1, \sqrt{2}]$$

si ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2 t}{2}}} dt \geq \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x 1 dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

Si potrebbe dimostrare che

$$\int_0^x 1 dt \leq F(x) \leq \int_0^x \sqrt{2} dt = x \leq F(x) \leq \sqrt{2}x$$

Esercizio 2

La derivata seconda di

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2 t}{2}}} dt, \quad F'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2 x}{2}}}$$

è

$$F''(x) = -\frac{1}{2} \left(1 - \frac{\sin^2 x}{2}\right)^{-\frac{3}{2}} \cdot \frac{-2 \sin x \cos x}{2} = \frac{\sin x \cos x}{2} \cdot \left(1 - \frac{\sin^2 x}{2}\right)^{-\frac{3}{2}}$$

Si ha

- gli zeri di $F''(x)$ si ottengono risolvendo $\sin x \cos x = 0$ i.e. $x = k\frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$
- $F''(x) > 0$ per $\sin x \cos x > 0$ i.e.

$$\left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right) + k\pi$$

Esercizio 2

Esercizio 3

Studiare la seguente funzione integrale

$$F(x) = \int_0^x \arctan(2 + \cos t) dt$$

Di questa funzione eseguiremo lo studio:

1. del dominio
2. del comportamento all'infinito
3. della derivata prima
4. della derivata seconda
5. ed eseguiremo una bozza del grafico

Esercizio 3

Soluzione

La funzione integranda non ha problemi di dominio

La derivata prima di

$$F(x) = \int_0^x \arctan(2 + \cos t) dt \quad \text{è} \quad F'(x) = \arctan(2 + \cos x)$$

Ora, dal fatto che $-1 \leq \cos t \leq 1 \iff 2 + \cos t \geq 1$ si ha

$$\arctan(2 + \cos t) \geq \arctan 1 > 0$$

e quindi

$$F'(x) > 0 \quad \forall x$$

Essendo strettamente crescente non ci sono mai massimi o minimi

Inoltre $F(0) = 0$ e quindi $F(x) > 0$ per $x > 0$ e $F(x) < 0$ per $x < 0$

Esercizio 3

La derivata seconda di

$$F(x) = \int_0^x \arctan(2 + \cos t) dt \quad , \quad F'(x) = \arctan(2 + \cos x)$$

è

$$F''(x) = \frac{1}{1 + (2 + \cos x)^2} \cdot (-\sin(x))$$

Si ha

- $F''(x) = 0$ per $\sin x = 0 \iff x = k\pi \quad , \quad k \in \mathbb{Z}$
- $F''(x) > 0$ per $-\sin x > 0 \iff x = (-\pi < x < 0) + k\pi$
- $F''(x) < 0$ per $-\sin x < 0 \iff x = (0 < x < \pi) + k\pi$

Esercizio 3

Essendo $\arctan$ una funzione strettamente crescente si ha

$$1 \leq 2 + \cos t \leq 3 \iff \frac{\pi}{4} \leq \arctan(2 + \cos t) \leq \arctan 3$$

e quindi per $x > 0$

$$\frac{\pi}{4} \cdot x \leq F(x) \leq \arctan(3) \cdot x$$

da cui

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$$

Esercizio 3

Con analogo discorso di dimostra che

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = -\infty$$

Si potrebbe dimostrare che $F(x)$ è dispari, i.e.

$$\begin{aligned} F(-x) &= F(x) = \int_0^{-x} \arctan(2 + \cos t) dt \\ &= (u = -t, du = -dt) = \int_0^x \arctan(2 + \cos(-u)) \cdot (-1) du \\ &= - \int_0^x \arctan(2 + \cos u) du = -F(x) \end{aligned}$$

Esercizio 3

FINE